

Tabella 2. Raccomandazioni sui periodi di esclusione dalla frequenza scolastica in corso di malattie infettive

<b>Malattia</b>	<b>Raccomandazione basata sull'evidenza<sup>1</sup> (grado di raccomandazione)</b>	<b>Raccomandazione CDC<sup>2</sup></b>	<b>Raccomandazione Ministero della Sanità<sup>3</sup></b>
<b>Varicella</b>	5 giorni dall'esordio dell'esantema (A)	5 giorni dall'esordio dell'esantema	5 giorni dall'esordio dell'esantema
<b>Morbillo</b>	5 giorni dall'esordio dell'esantema (B)	5 giorni dall'esordio dell'esantema	5 giorni dall'esordio dell'esantema
<b>Rosolia</b>	5 giorni dall'esordio dell'esantema (B)	6 giorni dall'esordio dell'esantema	7 giorni dall'esordio dell'esantema
<b>Parotite</b>	5 giorni dall'esordio (B)	9 giorni dall'esordio	9 giorni dall'esordio
<b>Pertosse</b>	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico 3 settimane in assenza di trattamento (B)	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico 3 settimane in assenza di trattamento	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico
<b>Epatite A</b>	Bambini < 5 anni: 5 giorni Bambini > 5 anni: nessuna restrizione (B)	Una settimana dall'esordio	Nessuna restrizione, precauzioni enteriche per 15 giorni dall'esordio dell'ittero
<b>Mononucleosi infettiva</b>	Nessuna restrizione (B)	Nessuna restrizione	Non riportato
<b>Faringite streptococcica</b>	Nessuna restrizione (B)	24 ore dall'inizio del trattamento antibiotico	Non riportato
<b>Scarlattina</b>	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico (B)	Non riportato	48 ore dall'inizio del trattamento antibiotico
<b>Pediculosi del capo</b>	Nessuna restrizione (C)	24 ore dall'inizio del trattamento	Fino all'avvio del trattamento certificato dal medico curante
<b>Salmonellosi</b>	< 5 anni: almeno un campione fecale negativo ≥ 5 anni: almeno 24 ore dall'ultimo episodio di diarrea (C)	Nessuna restrizione	<i>Nessuna restrizione</i>

<sup>1</sup>cfr. ref 3

<sup>2</sup>cfr. ref 2

<sup>3</sup>cfr Circolare Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998

Come si vede le raccomandazioni sono simili tra loro, tuttavia quelle basate sull'evidenza forniscono alcuni spunti che meritano di essere discussi. In particolare, gli Autori ritengono che 5 giorni di allontanamento siano sufficienti anche per rosolia e parotite, mentre per l'epatite A non viene raccomandata l'esclusione da scuola nei bambini > 5 anni, visto che la contagiosità è massima prima della comparsa dei sintomi e che nei bambini spesso la malattia è